

Suite de : Languedoc - Roussillon.

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 12-9-67 090209

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

## ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC.

(Tél. 72-58-72)

(AUDE,

GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes

C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

16, rue de la République - MONTPELLIER.

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

N° 84 - SEPTEMBRE 1967/32

### MOUCHE DES FRUITS

Les postes de piégeage de la Station d'Avvertissements continuent d'enregistrer quelques captures. Bien que la quantité d'insectes existant ne soit pas comparable avec la situation de Septembre 1966 la proportion des pontes dans les fruits encore au verger ira en s'accroissant avec la cueillette. Les poires d'automne et d'hiver, les pommes, recevront donc à nouveau une protection (Respecter strictement la législation relative aux dates limites d'emploi des produits).

### MOUCHE DE L'OLIVE ET CYCLOCONIUM

On observe actuellement de nouvelles piqûres sur les fruits, ainsi que des sorties récentes. Il semble qu'il y ait maintenant un chevauchement des générations ce qui rend nécessaire de nouveaux traitements, qui seront renouvelés pour assurer une protection permanente des olives. Respecter les délais d'emploi des insecticides en particulier pour les fruits à récolter en vert.

Ajouter un anticryptogamique pour prévenir les contaminations du cycloconium.

### OIDIUM DE L'ABRICOTIER

L'Oïdium commence à se manifester sur certains arbres; un traitement éliminera des germes dont la dispersion créerait des foyers d'infection lors des prochaines pluies.

### TRAITEMENT DES SEMENCES DE COLZA

Le traitement des semences prévient les premiers dégâts dus aux altises et à la fonte des semis. Utiliser un produit mixte insecticide et fongicide.

### ARBRES FRUITIERS A PEPINS

#### Pommier

Dans les vergers contaminés par la Zeuzère, appliquer un insecticide immédiatement si la récolte est enlevée. On emploiera le Mévinphos. Ce produit doit être utilisé de préférence, notamment si un deuxième ramassage est prévu dans huit jours.

#### Poirier

La lutte contre le Psylle ne doit pas être relâchée car les adultes sont encore en activité. Si le verger est contaminé par la Zeuzère le choix du produit sera fait en fonction de ce dernier ravageur.

LL. TROUILLON

M. BEZUT

### INFORMATIONS MARAICHÈRES

#### Teigne du poireau

On observe actuellement une recrudescence des attaques de Teigne.

Nous rappelons qu'il convient de traiter à une cadence de 8 à 10 jours, en mouillant abondamment.

Un des insecticides suivants pourra être utilisé : Carbaryl, D D T, ou organo phosphorés (autorisés en culture maraîchère).

1967. n° 84-87 + 24/15 P276

h. 50. 10636

P. CHRESTIAN